

LA METEOROLOGÍA DE LA GALERNA DEL CANTABRICO



"Jesús y adentro", Fdo. Pérez Camino. Museo de Bellas Artes de Santander.
Recreación de una lancha de pescadores del siglo XIX atravesando la barra del puerto, entre la península de la Magdalena y la isla de Mouro.

JOSE LUIS ARTECHE GARCIA

METEORÓLOGO

DELEGACION TERRITORIAL DE AEMET EN CANTABRIA

Sobre este fenómeno meteorológico existe una cierta controversia: tanto sobre su significado preciso como sobre su etimología, aun cuando para los marineros ribereños del Golfo de Vizcaya no necesite explicación. Ellos lo asocian rápidamente a muerte o gran desgracia aunque bien es cierto que alimentado por la leyenda creada en otros tiempos más que por lo que pasa en la actualidad. Pudiera estar su origen en los términos de la lengua bretona: "gwall (malo)-"horn" (esquina) o "gwall"- "kern" (plural de horn).

Las definiciones que vemos por ahí en unos casos pecan de muy generales, en otras asignan connotaciones que no son necesarias siempre (por ejemplo: fuertes lluvias) y, en la mayoría de ellos, asociadas a la idea de muertes por naufragio que, por suerte, ya no es tan fácil que ocurran.

Una definición que parece más apropiada es la de que una galerna consistiría en un viento súbito, fuerte o muy fuerte y racheado, acompañado o no de precipitaciones, propio del mar Cantábrico, en la época primaveral o veraniega, y que corta de manera brusca un tiempo apacible y generalmente caluroso. En Francia se le llama *galerie* y muchas veces se emplea el término "*entrée maritime subite*".

"Hay una palabra seria, con regusto de sal y de lágrimas, un galicismo hondo y temible, sonoro y lúgubre, que va siempre enlazado al holocausto de las gentes pescadoras del Cantábrico: la galerna..." (R. González Echegaray, 1981)

Noticiero Bilbaino (20-abril-1878) "Amanecía un maravilloso Sábado Santo con brisa suave y cálida, realmente primaveral, del nor-




Figura 1. Canal visible del satélite METEOSAT, a las 14:30 UTC, mostrando claramente ya la Línea de Turbonada, por delante del frente, a punto de entrar en Francia. Galerna del 07-06-1987
© EUMETSAT

deste, que convidaba a los pescadores a entregarse a sus faenas. Todas las lanchas pescadoras de nuestros pueblos salieron al alborar la bellísima mañana; varió el viento empezando a soplar del sur, y así continuó hasta la una menos cuarto, en que de una manera inesperada, sin señalarlo el barómetro, una manga de viento huracanado se dejó sentir del noroeste, con extraordinario ímpetu, descendiendo de tal modo y tan inesperadamente la temperatura que no hubo intervalos graduales entre el calor y el frío. En los tres cuartos de hora que duró aproximadamente el temporal, ¡Cuántos pescadores fallecieron!. A pesar de *llevarse Vizcaya la peor parte, la galerna azotó a toda la costa Cantábrica*"

Pero, ¿Qué es una galerna? ¿Es un frente activo, un turbón, una línea de turbonada...? o nada de lo anterior...

Desde comienzos del siglo XX, meteorólogos como Jose Manuel Orkologa (Director del Observatorio de Iguelo) o Ricart y Giralt explicaban y, como era lógico entre gente de ciencia, discrepaban sobre su idea de lo que para ellos era este fenómeno. Mariano D'Oporto, también Meteorólogo y Director del Observatorio de Iguelo habla de las galernas en trabajos de 1929.

En los años setenta el francés Raout realiza un amplio trabajo sobre la galernas. En los años ochenta, el Jefe del entonces Centro Meteorológico del Golfo de Vizcaya, José Ignacio

 CUESTION DE CONFIANZA	riusa INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASCENSORES ALQUILER DE MAQUINARIA OBRA PÚBLICA Pol. Ind. Wissocq - C/ Río Deva nº 3 39011 Santander Tel.: 942 21 56 58 Fax: 942 31 33 62 Email: riusa@riusa.es www.riusa.es
---	---

Álvarez Usabiaga, realizó una excelente síntesis sobre los tipos de galernas. Por estas épocas otros autores escriben sobre galernas, tal es el caso de Mariano Medina Isabel, el francés Wisdorf y Espel & Garmendia.

En los años noventa, tras el caso paradigmático de la galerna del 7 de junio de 1987, se inician las campañas *Previmet Galernas* en las que, siguiendo la clasificación de Usabiaga, se contemplan tres casos: las galernas frontales, las galernas híbridas y las galernas típicas, locales o del golfo de Gascuña.

A finales de los años noventa, el sistema de predicción del INM contemplaba dos posibilidades sobre las que cabía centrarse a la hora de clasificar estos fenómenos: galernas asociadas a sistemas frontales y galernas típicas.

A lo largo del siglo diecinueve, y durante la segunda mitad del mismo (que es únicamente el periodo del que hay noticias) hubo diez situaciones recordadas, incluyendo las de los años 1878 (la tremenda Galerna del Sábado de Gloria que glosa Jose M^a de Pereda en su novela costumbrista "Sotileza") y la de 1890.

En el siglo veinte y hasta el año 1985, momento en el que comienza en España una nueva forma de trabajar en Meteorología, con el con-

cepto de "vigilancia meteorológica", a través de los incipientes *Grupos de Predicción y Vigilancia*, se tiene noticia de tan solo once situaciones, destacando la famosa galerna de agosto de 1912, pero ocho de estas se datan ya dentro del periodo de inicio del desarrollo de la meteorología aeronáutica en España, coincidiendo con la guerra civil, hacia 1938, y el posterior resurgir, tras la contienda, de los Centros Meteorológicos. En el resto del siglo (quince años) se registran quince situaciones, destacando por su severidad la galerna del siete de junio de 1987 (Figura 1).

En el caso de las galernas típicas más fuertes el viento medio puede alcanzar los 80 km/h en la zona de máxima intensidad. Sin embargo, la mayoría de las galernas

típicas no alcanzan valores tan altos y cuando no sobrepasan la velocidad de, por ejemplo, 60 km/h se les denomina galernillas.

Quizás lo peligroso del fenómeno sea no tanto la fuerza del viento como la rapidez con que gira y arrecia. Es decir lo sorpresivo del fenómeno. A su paso, la galerna produce descensos bruscos de temperatura de hasta 12°C en 20 minutos y la humedad relativa aumenta hasta valores cercanos al 100%. Poco después del cambio de viento suele producirse la entrada de estratos bajos y bruma.

La galerna típica empeora rápidamente el estado de la mar pudiendo hacer zozobrar embarcaciones de poco porte. Es peligrosa también en las operaciones de aterrizaje y despegue de los aeropuertos (todos ellos cerca del mar en la cornisa cantábrica), en las playas, etc.

GALERNAS FRONTALES

Si dejamos para un poco más adelante la galerna típica y nos centramos en el resto de galernas, los marineros denominan como tal, en sentido general, a algo que llega rápido, sorpresivamente y que dura más o menos tiempo, durante el cual "rematará", con




Figura 2. Canal Infrarojo del satélite METEOSAT, a las 16:30 UTC, Galerna del 07-06-1987
© EUMETSAT

fuerte viento y una mar muy agitada, lo ya iniciado con el primer golpe de la mar. Como dice González Echegaray, *"la galerna verdad del Cantabrico es un temporal instantáneo y durísimo que se produce generalmente en primavera y otoño"*. *"No son propiamente galernas, aunque así se las llame frecuentemente, las virazones o turbonas de verano de carácter muy local..."* No obstante, en ocasiones se denominan galernas a episodios que, ellos mismos, se anuncian con tiempo suficiente y que en algún momento arrecian más de lo debido. Así, se denominó galerna a un temporal del Noroeste que en julio de 1961 se inició tras el paso de un frente pero que arreció casi 24 horas después. El resultado fue de 83 pescadores ahogados en un tiempo en el que, como recuerda un marinero retirado y que sobrevivió a aquello, *"el que era un poco espabilado, andaba con el parte francés, pero sobre todo a base de experiencia...y miedo"*. En general será el paso de un frente muy activo pero fuera del inicio del otoño o del invierno, épocas en las que las borrascas atlánticas a su paso por el Golfo de Vizcaya no traen delante del frente frío un tiempo apacible sino muy ventoso, del SSW, e inestable. En oc-




Figura 3. Análisis PSL 07-06-1987 Meteo France

asiones puede ser algo prematuro, tal fue el caso de la galerna del Sábado de Gloria, el 20 de abril de 1878, que se cobró en pocas horas más de trescientas vidas. Otros casos rememorados fueron la muy severa del 26 de abril de 1890, con 54 ahogados, y la ocurrida el 12 de julio de 1908, con 40 pescadores muertos, as como la de la noche del 12 al 13 de agosto de 1912, probablemente con una línea de turbonada prefrontal, que



Cuidamos tu entorno

Calle La Gloria, 86 - La Albericia - 39012 Santander (Cantabria)
 Telfs: 942 33 36 11 / 33 86 18 - Fax: 942 33 96 05 - Apartado de Correos 227
www.bloquesmontserrat.com - correo@bloquesmontserrat.com









Figura 4. Comportamiento de la temperatura, humedad, presión y viento al paso de una galerna típica fuerte. 25-07-1995
 Arastí, Barca, E., 1999

dejó 141 muertos, entre ellos gran parte de la flota pesquera vizcaína, que faenaba a 60 millas al norte de Bermeo, localidad vasca marcada para siempre por este acontecimiento. Este año lo rememorarán especialmente en Bermeo en su centenario.

Estas galernas, que inquietaban el ánimo del país a través de la prensa nacional, dieron paso a algunos Decretos suscitados por el Gobierno en materia de seguridad en la mar (Ley de Ordenación General de la Pesca en España, de 1884), los cuales pretendían paliar el lastimoso estado de indefensión de la flota pesquera española que faenaba cerca de nuestras costas por aquél entonces. Igualmente se tomaron resoluciones referentes a la prontitud necesaria de los partes meteorológicos

Es, sin duda, la galerna del 7 de junio de 1987, la que ha sido más conocida entre las galernas frontales del pasado siglo: una estructura frontal estacionaria reactivada por delante de una depresión secundaria que se forma en el golfo de Vizcaya: se produce durante la noche previa y madrugada de esa fecha una intensa interacción, no muy habitual, del flujo subtropical en niveles altos con aire de procedencia polar (ver imagen del satélite Meteosat, Figura 2), dando lugar a una estructura de katafrente con una línea de turbonada prefrontal, digna de cualquier clima tropical (Figura 3). La depresión, a su paso por la región francesa de Charente, con vientos fuertes, pero no excepcionales, origina abundantes daños. Por otro lado el paso de la línea de turbonada, con vientos muy fuertes, dio lugar a numerosos desperfectos en la costa cantábrica española y en el suroeste francés. Los vientos alcanzaron los 130 km/h en algún punto de la costa. Ocho fallecidos en total, pero nadie en la mar. ¿Qué hubiese ocurrido si ese siete de junio hubiera sido de algún año del siglo diecinueve?

LA GALERNA DEL GOLFO DE GASCUÑA O GALERNA TÍPICA

Afinando un poco tras buscar en hemerotecas y archivos climatológicos se averigua que los pequeños o fuertes giros bruscos del viento en el verano de la costa cantábrica, generalmente al este de Cabo Mayor, aunque no necesariamente, y que Álvarez Usabiaga denominó como "*galerna típica*", son muy frecuentes y con resultados que, en ocasiones, pueden resultar serios para la navegación deportiva e, incluso, para la aeronáutica tanto general como comercial. Se han estudiado varios casos, siendo uno destacable, a la vez que representativo, el del día 25 de julio de 1995 (Arasti Barca, E., 1999).

Estamos ante un fenómeno de los denominados "*corrientes de densidad costeras atrapadas*" y que tiene equivalente en muchos lugares del mundo cerca de costas montañosas sim-




Figura 5 Tendencia de la temperatura ($^{\circ}\text{C}/6\text{ hr}$) 850 mb 25-07-1995




Figura 6 Tendencia de la presión -macroescala (mb/3 hr) 25-07-1995



**ACCASTILLAGE
DIFFUSION**
Larga vida a tu barco

Todo para tu embarcación.



ACASTILLAJE...

FONDEO, NAVEGACIÓN...

CONFORT, MOTOR, ELECTRÓNICA...

INSTALADOR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Pto. Dptvo. Getxo, Área Técnica Pab. B-1. 48990 Getxo (Vizcaya) • Tel. 94 491 40 02 • ocinorte@ocinorte.com • www.ocinorte.com




Figura 7. Análisis PSL (mb) 25-07-1995

ilares a las del Cantábrico: California, sur de Australia, Sudáfrica, etc. El modelo conceptual actual que se maneja de la galerna típica es el siguiente:

El viento de la galerna típica es un flujo ageostrófico que es la respuesta a los gradientes mesoescalares de presión, cada vez más intensos, que se producen a lo largo de la costa cantábrica. Estos gradientes son producidos por el desigual comportamiento de la tendencia de la presión, positiva al oeste y negativa en la mitad oriental del Cantábrico.

El aire fresco del oeste se enfrenta, cada vez con más ímpetu, con aire que va calentándose, originándose un fuerte contraste térmico en la interfase, que se puede asimilar en la práctica a un micro frente que separa dos fluidos de características térmicas muy diferentes. El espesor del aire frío posterior al micro frente aumenta gradualmente por idénticos motivos.

Así se explica que la galerna típica tenga las características de un paso frontal, con viento racheado, ascenso de la presión, descenso de la temperatura (Figura 4), y que estos cambios sean cada vez más intensos. Cuando la galerna típica entra en

su fase de disipación toma las características de una corriente de densidad. El micro frente asociado a esta corriente de densidad, y por tanto a la galerna, ha sido visualizado gracias a la pequeña estructura nubosa con forma de arco que se genera en la interfase. Esto no es frecuente ya que la galerna típica no suele producir nubosidad en su parte delantera.

La galerna típica recorre unos quinientos kilómetros en diez horas. Se pueden distinguir tres zonas. La primera, entre Avilés y Cabo Mayor: la zona de desarrollo. En ella el viento no llega a la escala de fuerte. Entre Ontón,




Figura 8. Análisis Mesoscalar de tendencia de la presión (mb/ 3 hr) a las 12 UTC 25-07-1995

en el borde oriental de Cantabria, y Biarritz se encuentra la zona de máxima intensidad. En ella el viento medio en la costa alcanza los 80 km/h, con rachas cercanas a 100 km/h y descensos de temperatura de 12° en 20 minutos. A partir de Biarritz la galerna entra en su fase de disipación. La velocidad de la galerna aumenta conforme se propaga hacia el este, alcanzando su valor máximo, 20 m/s, en las inmediaciones de San Sebastián, disminuyendo posteriormente. Su mayor intensidad se produce en la zona costera, disminuyendo rápidamente hacia el interior. Mar adentro la galerna afecta a una extensión de no más de 57 km. a partir de Cabo Higuer.

Su escala horizontal se encuentra dentro de la meso-β, según la clasificación de Orlanski (1975). Los gradientes mesoescalares de presión y temperatura estimados son de 5 mb en 50 km. y de 13°C en 30 km. La galerna típica es bastante superficial. Está limitada a la parte más baja de la troposfera, por debajo, en general, de los 1800 metros. El viento es máximo en los niveles inferiores, disminuyendo con la altura. Poco después de su irrupción se produce la entrada de estratos bajos y bruma, pero no se produce precipitación. El estado de la mar asociado a una galerna típica es de Fuerte Marejada. La altura significativa de las olas se encuentra próxima a 2 metros y la altura máxima a 4 metros

La tendencia barométrica opuesta que se observa sobre el Cantábrico se puede asociar

al flujo en niveles próximos a 850 mb. y a la advección de masas de aire frío y cálido sobre el Cantábrico, por parte de dicho flujo. (Figuras 5 y 6). No obstante, no todo ascenso de presión es achacable a la escala sinóptica. Así, a las 12 UTC se genera un débil gradiente de presión entre Avilés y Santander, forzado exclusivamente por el flujo sinóptico, que ocasiona los giros de viento en la costa asturiana, que a su vez inician los procesos mesoescalares. El gradiente de presión se va intensificando por la acción conjunta del flujo a escala sinóptica y a mesoescala (más resolución que la sinóptica).

En el litoral, la irrupción de una masa de aire fría en superficie con un espesor cada vez mayor, ocasiona un ascenso mesoescalar de la presión que, junto a la desigual tendencia barométrica que genera el flujo sinóptico da como resultado un intenso gradiente de presión a esa misma escala meteorológica. Por lo tanto, es la escala sinóptica la que inicia los procesos mesoescalares y, posteriormente, la acción conjunta de las dos escalas produce los intensos gradientes que acelera el viento. Esto, unido al fuerte contraste de temperatura, termina por generar el microfrente de galerna, que hemos podido visualizar en las imágenes de satélite.

La época favorable para la ocurrencia de la galerna típica es la comprendida entre el final de la primavera y principio del otoño, pero sobre todo el verano.


TODPOL S.XXI,s.l

TODOS EN POLIÉSTER



FABRICACION Y REPARACIÓN DE
POLIÉSTER Y CARBONO

- REPARACIÓN DE GEL COAT
- TRATAMIENTO DE OSMOSIS
- CONSTRUCCIÓN DE MOLDES
- OBRAS DE TODO TIPO EN BARCOS
- REPARACIÓN DE PISCINAS



POLÍGONO DE HERAS, PARCELA 293
39792 MEDIO CUDEYO CANTABRIA
TFO.: 942544464 - 600366455
todpolxx1@hotmail.com
WWW.TODOPOLIÉSTER.COM




Figura 9 Análisis mesoescalar de la tendencia de la presión. Arasti, Barca 1999

El marco sinóptico favorable en superficie es el de flujo débilmente ciclónico o de pantano barométrico sobre el Cantábrico. El nivel de 850 mb. se caracteriza por una dorsal térmica sobre el Cantábrico oriental, sobre todo si a una advección cálida con viento del SW le sigue una rápida advección fría con viento del W. En la Figura 7 se muestran los análisis de presión a 12 y 18 UTC. La línea roja discontinua representa el eje de la dorsal térmica en 850 mb. Dicho eje se traslada hacia el nordeste, con su extremo inferior, que está asociado a las máximas temperaturas en 850 mb, apuntando al centro de la baja mesoescalar.

Si se cumple el marco sinóptico y la época favorable, hay que iniciar la vigilancia específica del fenómeno. Concretamente hay que vigilar la formación de un gradiente de presión paralelo a la costa (Arasti, 2002), con mayor presión al oeste que al este, así como su intensificación. Esto puede hacerse mediante el análisis mesoescalar de los campos de presión y, sobre todo, de la tendencia de pre-



- Limpiezas generales
- Limpieza y mantenimiento de comunidades y locales
- Limpieza del automóvil en general
- Limpieza de cristales y persianas
- Limpiezas de moquetas, alfombras y especialidad en sofás
- Pulido/Abrillantado/Cristalizado de pavimentos
- Limpieza/Restauración de fachadas

General Dávila, 236 A/B, bajo
39006 SANTANDER

Tel. / Fax 942 32 01 21
sotileza@wanadoo.es

DOCAL

PINTURAS HEMPEL



**ESTACIÓN SERVICIO BALSAS
SALVAVIDAS**

www.docal.es

Avda. Candina, 28. Santander

Pol. Ind. Falmuria Nave 15. (Prendes). Gijón

Tfno.: 942 32 43 00 - Fax: 942 31 44 60 - docal@docal.es

sión en superficie. Este último campo es importante ya que es el responsable de la formación del gradiente de presión objeto de nuestra vigilancia. Es claro que en la galerna estudiada da más información el análisis de tendencia de las 12 UTC (Figura 8) que el de presión de la misma hora.

En el gráfico de la Figura 9 se observa que hay dos grandes zonas con tendencia barométrica diferente. Tanto en una zona como en la otra el valor de la tendencia se intensifica.




Figura 10. Análisis PSL (mb) a las 15 UTC 25-07-1995

En la parte del litoral asturiano con tendencia barométrica positiva el viento ya ha girado al oeste, lo cual es consecuente con el hecho de que los giros de viento son prácticamente simultáneos con el ascenso de la presión. Sin embargo, estos análisis mesoescalares tienen dos inconvenientes: son trihorarios y, además, hay un retraso como consecuencia de la “asimilación” de las observacio-

metaltec
naval

DISEÑO CONSTRUCCIÓN TRANSFORMACIÓN

ASTILLERO NAVAL



Ingeniería
Proyecto y construcción
Fabricación accesorios acero-inox

TRANSFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO

Reparación y mantenimiento integral
Instalaciones y electrónica de navegación



COMPOSITES



Fibra de carbono y polyester
Refits
Acastillaje
Mantenimiento

metaltecnaval.com



INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

nes. Es por esto que se propuso un método complementario. Éste consiste en realizar observaciones horarias de presión reducida al nivel del mar, viento y temperatura, en los observatorios de Ranón (Asturias), Santander, Sondica, Igeldo y Fuenterrabía. Esto, completado con datos de viento y temperatura de estaciones automáticas, es suficiente para vigilar el gradiente de presión paralelo a la costa responsable de la galerna típica, y su intensificación. Además, no hay que olvidar que la galerna se propaga a lo largo de la costa. Por lo tanto, deberemos vigilar la galerna cuando ésta se encuentre en su fase de desarrollo para pronosticar su fase de máxima intensidad con un par de horas de anticipación. Así, si se observa que el gradiente de presión y el viento del oeste asociado se intensifican, es muy probable que los cambios en las variables meteorológicas se aproximen gradualmente a los de una galerna en su fase de máxima intensidad.



En la Figura 10 se observa un ejemplo de análisis mesoescalar del campo de presión en superficie. La imagen corresponde al canal visible del satélite Meteosat de las 15 UTC. La situación ha cambiado radicalmente. La galerna ha llegado ya al cabo de Machichaco donde se registran rachas de 104 km/h, pero todavía no ha llegado a Lequeitio, unos 20 km. más al este. Por el oeste ha penetrado con rapidez una dorsal mesoescalar de alta presión que, junto con la baja centrada en Navarra, origina un fuerte gradiente de presión. Así, el viento de la galerna es un flujo ageostrófico que responde al gradiente de presión mesoescalar que se observa en el análisis. Sobre el litoral vasco donde todavía no ha llegado la galerna hay un aire cálido y seco que alcanza los 36°C, como consecuencia de su procedencia terrenal y del recalentamiento sufrido en el descenso a la costa, que, como ya hemos visto, es consecuencia de la circulación ciclónica, casi estacionaria, que

afecta a dicha zona. Estas temperaturas contrastan con los 23 °C en la zona de galerna, es decir, 13°C de diferencia en unos pocos kilómetros. Este fuerte contraste térmico se puede asimilar en la práctica a una interfase o microfrente que separa dos fluidos con características térmicas muy diferentes. Así se explica que el paso de la galerna típica tenga las características de un paso frontal. A unas decenas de kilómetros detrás de la galerna se encuentra la zona de estratos y niebla característica del fenómeno. La nubosidad que se observa en la imagen nos puede informar del campo de viento superficial. Así, la nubosidad que se encuentra en el litoral, y que coincide con el paso de la galerna, está adelantada respecto de la nubosidad que se observa más al norte. Esta forma de la nubosidad es consecuente con el campo de viento esperado para una zona costera de las características topográficas de la costa cantábrica.

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

En este artículo se ha hecho más hincapié en las galernas típicas pues son las que se han podido estudiar con más detalle. Sobre la galerna del 7 de junio se han realizado numerosas simulaciones numéricas a lo largo de los últimos años (CNRM, Francia) de lo que fue en esencia este fenómeno: una línea de turbonada.

Si bien la propuesta de vigilancia sobre los campos de tendencia de la presión, en el caso de la galerna típica, durante un día favorable parece conveniente y acertada, hoy en día se ve igualmente necesario e indispensable el que exista una herramienta objetiva de predicción que avance los giros de viento con suficiente precisión y antelación como para poder prevenir con éxito.

En el caso de la línea de turbonada se demostró ya con el antiguo modelo Peridot, así como en otras simulaciones en EEUU, que parametrizando los "downdrafts" (corrientes descendentes mesoescalares dentro de la nube) y aumentando la resolución, sin necesidad de formular de modo explícito en el modelo los fenómenos de microfísica internos dentro de una Línea de Turbonada, se conseguía una cierta simulación del fenómeno. Hoy en día, con la nueva serie de modelos operativos de mayor resolución y que utilizan formulaciones simuladas en modelos de tipo no hidrostático (AROME, en Francia) se está consiguiendo una gran pericia en prever este tipo de eventos.

Queda por avanzar en los fenómenos de *corrientes de densidad atrapadas*, tal sería el caso de la más modesta *galerna típica*, pero cuya frecuencia es abrumadoramente mayor. Son fenómenos distintos pero parece factible crear modelos numéricos meteorológicos adecuados a su escala.



INDUSTRIAS AGUSTIN

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN y DERIVADOS

C/. Virgen del Mar, 31 - nave 1
39012 SAN ROMÁN DE LA LLANILLA (Santander)
Línea principal Tel./Fax: **942 33 35 63**
Tel.: 942 33 50 96 • Móvil: 610 26 65 44
www.industriasagustin.com • info@industriasagustin.com

- * INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y GAS PARA:
VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INSÓS, LOCALES, OBRA NUEVA, REFORMAS
- * SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
- * INSTALACIONES DE INCENDIOS, SISTEMA RANURADO, AIRE COMPRIMIDO
- * TEJADOS: CANALONES, BAJANTES EN COBRE, PVC, ZINC, PLOMO
- * REPISES EN ZINC, COBRE Y PLOMO
- * INSTALACIONES DE POLIETILENO, POLIBUTILENO Y POLIPROPILENO RETICULADO
- * INSTALACIONES DE PANELES SOLARES
- * UNA AMPLIA CARTA DE SERVICIOS QUE SE AJUSTAN A SUS NECESIDADES
- * PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Tl. 902 305 151 www.sacoutil.com



EL SACO ÚTIL
gestión integral de residuos

**RECOGIDA DE
RESIDUOS PELIGROSOS y
NO PELIGROSOS**

